

## Hogna radiata, Lycose radiée ou Lycose tarentuline

Photographies d'une Lycose radiée femelle transportant ses nombreux bébés sur son dos.

Pensez à zoomer pour les distinguer.

Observation et photographies dans un chemin de Reynier - 04.

Cette araignée aranéomorphe est commune mais a presque disparu en Provence du fait des sécheresses successives.

Les araignées aranéomorphes représentent 93 % des araignées dans le monde : leurs crocs situés au bout des chélicères se croisent comme une paire de pinces pour pincer leur proie.

Dans le sous-ordre des mygalomorphes, 7 % des araignées, les crocs sont verticaux.

Taille: c'est une grande araignée. Femelle : 14 à 25 mm - Mâle : 10 à 18 mm

Habitat : elle colonise les milieux rocaillieux et chauds- C'est une araignée errante.

Chasse : le jour, cette araignée-loup capture ses proies: grillons, criquets, coléoptères,

Reproduction printanière : la femelle pond puis transporte son cocon comprenant une centaine d'œufs. Les jeunes montent sur le dos de leur mère pendant quelques jours avant de se disperser dans le milieu naturel. Ces juvéniles seront adultes au printemps prochain.



Remerciement à Anne Bounias-Delacour pour son aide à l'identification sur cliché

Texte et photos : Catherine Begnis