


## Sortie botanique – Saint-Cannat (13) 19 mai 2026

Le but de cette sortie était de prospecter la zone autour du carrefour des Quatre-Termes, sur la commune de Saint-Cannat, à la fois les pelouses sèches et la garrigue, mais aussi les plantes messicoles.

Malheureusement pour ces dernières, cette année les champs venant juste d'être labourés, nous n'en avons pas trouvé beaucoup. Par contre la zone de pelouse et garrigue contenait un très grand nombre d'espèces.

Dans l'après-midi, nous avons aussi exploré d'autres pelouses, sur la D18 en direction d'Éguilles. Nous étions huit participants motivés et très intéressés.

Le sous-sol de cette zone est essentiellement formé de sédiments calcaires datant de l'Oligocène et même du quaternaire. On y trouve donc un grand nombre d'espèces fréquentes dans la garrigue provençale.



*Situation de Saint-Cannat et des deux zones prospectées : les Quatre-Termes (en bleu) le matin  
et sur la D18 (en rouge) l'après-midi.*

### Friche, pelouse sèche et garrigue en mosaïque

Le matin, en arrivant, nous nous sommes garés à proximité du carrefour des Quatre-Termes en empruntant un petit chemin donnant sur un terre-plein. Dès notre descente de voiture, nous remarquons que de très nombreuses espèces sont présentes à cet endroit. On trouve des plantes poussant habituellement dans les friches, d'autres plus habituées aux pelouses sèches et d'autres surtout fréquentes dans la garrigue. Mais il n'y a aucune limite nette au niveau de la répartition et de la topographie, elles sont ici toutes mélangées.



Toute la matinée, nous avons relevé, sans aucune pause, toutes les espèces présentes. Nous avons juste eu le temps d'en photographier quelques-unes, sur lesquelles nous nous sommes un peu attardés.

Il serait donc long et fastidieux, voire même inutile, de lister ici toutes nos observations. Une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas d'un véritable compte-rendu, il vaut mieux considérer ce document comme un tout petit complément photographique aux relevés par stations, par ordre alphabétique et par familles que l'on peut trouver sur notre site internet. Ceux-ci seront beaucoup plus parlants.

Voici donc une petite galerie photographique, très restreinte, des espèces qui ont retenu notre attention.



*Echinaria capitata*  
Échinaire en tête



*Lathyrus aphaca*  
Gesse aphyllé (en fruits)



*Trigonella esculenta*  
Trigonelle comestible



*Paronychia capitata*  
Paronyque en tête



*Sideritis romana*  
Crapaudine romaine



*Helianthemum salicifolium*  
Hélianthème à feuilles de saule



*Picnomon acarna*  
Picnomon acarna (non fleuri)



*Bromus lanceolatus*  
Brome lancéolé



*Phlomis lychnitis*  
Phlomis lychnite



*Carduus nigrescens*  
Chardon noirissant



*Lotus hirsutus*  
Lotier hirsute, Bonjeanie



*Astragalus stella*  
Astragale en étoile

Pour donner rapidement une idée un peu plus précise de l'important cortège floral, on peut citer un certain nombre d'espèces présentes (noms scientifiques uniquement, liste loin d'être exhaustive).

Outre une trentaine de Poacées, on peut observer des espèces très courantes des friches, par exemple *Isatis tinctoria*, *Euphorbia helioscopia*, *Erodium ciconium*, *Erodium malacoides*, *Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia*, *Carduus pycnocephalus*, *Diplotaxis eruroides*, *Fumaria officinalis*, *Lobularia maritima*, *Senecio vulgaris*, *Sonchus tenerrimus*, *Urospermum dalechampii*, *Vicia hybrida*, etc.

Parmi les espèces classiques de la garrigue ou des pelouses sèches, on peut citer, entre autres, *Cistus albidus*, *Cistus salviifolius*, *Phillyrea angustifolia*, *Rhamnus alaternus*, *Thymus vulgaris*, *Argyrolobium zanonii*, *Anthyllis vulneraria* subsp. *rubriflora*, *Aphyllanthes monspeliensis*, *Campanula rapunculus*, *Euphorbia serrata*, *Helianthemum hirtum*, *Helichrysum stoechas*, *Jasminum fruticans*, *Lonicera implexa*, *Medicago minima*, *Rhaponticum coniferum*, *Scabiosa atropurpurea*, *Sideritis provincialis*, *Silene italica*, *Tragopogon porrifolius*, *Trifolium stellatum*, etc.

Mais sont présentes également quelques espèces un peu moins courantes, notamment *Blackstonia perfoliata*, *Convolvulus cantabrica*, *Coronilla scorpioides*, *Crepis pulchra*, *Ervum gracile*, *Herniaria hirsuta*, *Hippocrepis ciliata*, *Neatostema apulum*, *Ophrys scolopax*, *Plantago afra*, *Silene nocturna*, *Stachys recta* ou encore *Teucrium botrys*.

## Bords des routes et des champs

Après le pique-nique, nous sommes allés herboriser au bord des routes et sur les limites des champs de l'autre côté de la D17. Mais comme cela a été dit en introduction, les champs étant labourés depuis peu, nous n'avons pas pu observer les espèces messicoles. Nous avons quand même pu déambuler dans quelques champs en jachère, mais il n'y avait pas une grande variété d'espèces.



Herborisation en  
bordure de route



Exploration des champs en jachère.

Parmi les espèces rencontrées, on peut citer *Allium polyanthum*, *Anthemis arvensis* subsp. *incrassata*, *Artemisia verlotiorum*, *Ballota nigra* subsp. *foetida*, *Calendula arvensis*, *Conium maculatum*, *Crepis foetida* subsp. *foetida*, *Dasypyrum villosum*, *Helianthemum nummularium*, *Hirschfeldia incana*, *Lathyrus cicera*, *Lepidium draba*, *Malva sylvestris*, *Melica ciliata*, *Nigella damascena*, *Papaver rhoeas*, *Potentilla hirta*, *Ranunculus bulbosus*, *Rumex pulcher*, *Salvia verbenaca*, *Sedum acre*, *Seseli tortuosum* (non fleuri), *Silene latifolia*, *Silene vulgaris*, *Silybum marianum*, *Trifolium angustifolium*, *Verbascum sinuatum* et *Vicia villosa* subsp. *eriocarpa*.



*Allium polyanthum*  
Ail à fleurs nombreuses



*Anthemis arvensis* subsp. *incrassata*  
Anthémis à pédoncules renflés



*Ballota nigra* subsp. *foetida*  
Ballote fétide

### Pelouses sèches sur la D18 en direction d'Éguilles

Nous décidons ensuite de reprendre les voitures et d'aller explorer des pelouses sèches sur la D18 en direction d'Éguilles. Nous nous y étions arrêtés deux ans auparavant et les avions trouvées assez intéressantes. Mais cette année, les espèces sont moins nombreuses et la floraison plus tardive.



*Divers aspects des pelouses sèches, plus ou moins fournies.*

Sur ces pelouses, nous avons quand même pu voir certaines espèces intéressantes, notamment plusieurs orchidées et le Chardon à aiguilles (*Carduus acicularis*) qui est même assez rare.

Notre prospection ne s'est pas limitée aux pelouses, nous sommes aussi allés voir les friches en bordure de champ. On trouvera ci-dessous les espèces photographiées lors de cette herborisation.



*Ophrys scolopax*  
Ophrys bécasse



*Ophrys bertolonii*  
Ophrys de Bertoloni



*Ophrys apifera*  
Ophrys abeille



*Crupina vulgaris*  
Crupine vulgaire



*Filago pyramidata*  
Cotonnière pyramidale



*Carduus acicularis*  
Chardon à aiguilles



*Thymus embergeri*  
Thym d'Emberger



*Bupleurum baldense*  
Buplèvre du Mont Baldo



*Cota altissima*  
Anthémis géante



*Centaureum pulchellum*  
Petite Centaurée délicate



*Helichrysum stoechas*  
Immortelle



*Tordylium maximum*  
Tordyle élevé



*Torilis leptophylla*  
Torilis à feuilles étroites



*Echinops ritro*  
Échinops ritro, Oursin bleu



*Ranunculus arvensis*  
Renoncule des champs (fruits)



*Galium tricornutum*  
Gaillet à trois cornes (fruits)



*Phlomis herba-venti*  
Phlomis herbe au vent



*Medicago sativa* subsp. *sativa*  
Luzerne cultivée



*Sideritis provincialis*  
Crapaudine de Provence

Outre les espèces représentées en photo, on peut encore citer l'Orchis pyramidal (*Anacamptis pyramidalis*), la Blackstonie perfoliée (*Blackstonia perfoliata*), la Campanule raiponce (*Campanula rapunculus*), la Vipérine commune (*Echium vulgare*), le Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*), l'Euphorbe dentée (*Euphorbia serrata*), le Fenouil (*Foeniculum vulgare*), le Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum*), le Troène commun (*Ligustrum vulgare*), le Mouron bleu (*Lysimachia foemina*), le Pallénis épineux (*Pallenis spinosa*), la Sauge verveine (*Salvia verbenaca*), la Stipe plumeuse (*Stipa eriocalis*), la Germandrée tomenteuse (*Teucrium polium* subsp. *polium*), le Thym (*Thymus vulgaris*), l'Urosperme de Daléchamp (*Urospermum dalechampii*), la Doucette couronnée (*Valerianella coronata*), la Doucette discoïde (*Valerianella discoidea*) et bien d'autres encore (voir inventaire).

### Les insectes du jour



*Spirix striata* M  
Écaille striée



*Cucullia verbasci*, Chenille  
Cucullie du bouillon blanc



*Lachnaia paradoxa*  
Lachnée paradoxale

Si cette sortie n'a pas apporté beaucoup de nouveautés, le grand nombre d'espèces présentes (222 taxons notés !) a permis une grosse révision des connaissances pour plusieurs participants. C'était en fait une journée très agréable et détendue, sous un beau soleil.

Texte et photos de fleurs : Jean-Claude MÉRIC  
Photos de paysages : Martine AÏTELLI