


Sortie botanique – Montagne de Lure (04) 15 juin 2026

Nous n'étions pas retournés sur la Montagne de Lure depuis 8 ans. Nous avons donc remis cette destination au programme de cette année, car plusieurs personnes n'avaient pas participé aux sorties de 2017 et 2018.


Malheureusement, à l'approche des vacances et en période de canicule, les volontaires ont été finalement peu nombreux et c'est avec un effectif très réduit (5 personnes) que s'est déroulée cette journée. Le soleil et la forte chaleur étaient aussi au rendez-vous, mais l'altitude les rendait supportables.

La Montagne de Lure, qui culmine à 1826 m, est très riche sur le plan floristique et c'est l'occasion d'approcher plusieurs milieux des Préalpes de Haute-Provence. L'adret, les crêtes et l'ubac sont extrêmement différents et c'est la bonne période pour la floraison.



*Situation géographique de la Montagne de Lure.
Le lieu de rendez-vous était à Saint-Étienne-les-Organes.*

L'objectif était donc de faire plusieurs arrêts sans s'éloigner de la voiture. Il n'y avait pas de marche au programme afin d'observer le plus grand nombre d'espèces possible. Au total nous avons ainsi prospecté neuf stations.



Sur cette carte, il faut repérer la route en jaune pour comprendre les différents arrêts lors de cette journée.

Du point de vue géologique, la Montagne de Lure est un grand pli anticlinal calcaire d'orientation est-ouest. Il est dans le prolongement du Mont-Ventoux qui se trouve à l'ouest. Les sédiments calcaires proviennent d'une mer ancienne et le plissement remonte à deux périodes : une première à la fin de l'ère secondaire, la deuxième lors de la surrection des Alpes au Miocène.

Le versant sud (adret) plonge en pente relativement douce vers le bassin de Forcalquier et le plateau d'Albion, avec des combes et des vallons orientés nord-sud.

Le plateau de la crête est de type karstique, il est donc très perméable et permet l'infiltration de l'eau. Il est soumis à des vents parfois violents et la partie sommitale reste totalement enneigée l'hiver.

Le versant nord (ubac) est plus raide et abrupt. Il domine la Vallée du Jabron et repose sur une zone de marnes bleues et de failles.

Premier arrêt, en lisière de forêt, au carrefour de Notre-Dame de Lure

A partir de Saint-Etienne-les-Orgues, la montée se fait d'abord à découvert, mais très rapidement la route serpente à travers la Forêt Domaniale de Lure. Nous décidons de faire un premier arrêt au niveau du carrefour de la petite route à peine carrossable qui descend à Notre-Dame de Lure, afin d'observer la végétation en lisière de forêt.

Celle-ci est mixte, elle est constituée des espèces suivantes : le Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*), le Pin noir (*Pinus nigra* subsp. *nigra*), le Hêtre (*Fagus sylvatica*), le Chêne pubescent (*Quercus pubescens*), le Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica*), l'Érable à feuilles d'obier (*Acer opalus*), le Sapin blanc (*Abies alba*) et l'Alisier blanc (*Sorbus aria*, syn. *Aria edulis*). Quelques arbrisseaux poussent aux endroits plus découverts : l'Aubépine (*Crataegus monogyna*), l'Églantier (*Rosa canina*) et le Rosier rouillé (*Rosa rubiginosa*), très glanduleux. La Ronce blanchâtre (*Rubus canescens*) complète cette strate arbustive... et épineuse !

Sur le bord de route, en situation bien exposée, ou sur la trouée en dessous de la ligne électrique, on note l'Arrête-bœuf (*Ononis spinosa* subsp. *procurrens*), le Thym d'Emberger (*Thymus embergeri*), le Thym à nervures saillantes (*Thymus nervosus*), la Lavande à feuilles étroites (*Lavandula angustifolia*), la Sarriette (*Satureja montana*), l'Anthyllis des montagnes (*Anthyllis montana*), l'Anthyllis de Foronda (*Anthyllis vulneraria* subsp. *forondae*), l'Anthyllis à fleurs rouges (*Anthyllis vulneraria* subsp. *rubriflora*), l'Achillée odorante (*Achillea odorata*), le Gaillet vrai (*Galium verum* subsp. *verum*), le Gaillet à folioles inégales (*Galium anisophyllum*), le Chardon noircissant (*Carduus nigrescens*), la Centaurée paniculée (*Centaurea paniculata*), l'Épervière piloselle (*Pilosella officinarum*), l'Épervière leiopogon (*Hieracium leiopogon*), la Knautie des collines (*Knautia collina*), l'Hellébore fétide (*Helleborus foetidus*), le Lin sous-arbrisseau (*Linum suffruticosum* subsp. *appressum*), l'Héliantheme d'Italie (*Helianthemum italicum*), le Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* subsp. *corniculatus*), la Sauge des prés (*Salvia pratensis*), la Germandrée petit-chêne (*Teucrium chamaedrys*), le Clinopode commun (*Clinopodium vulgare*), la Brunelle laciniée (*Prunella laciniata*), le Trèfle blanc-jaunâtre (*Trifolium ochroleucon*), la Véronique officinale (*Veronica officinalis*), ainsi que quelques espèces très communes et ubiquistes (voir relevé).



Lisière de sous-bois,
trouée de la ligne électrique



Ononis spinosa subsp. *procurrens*
Arrête-boeuf



Rosa rubiginosa
Rosier rouillé



Clinopodium vulgare
Clinopode commun



Anthyllis vulneraria subsp. *forondae*
Anthyllis de Foronda



Pilosella officinarum
Épervière piloselle

Deux orchidées sont bien présentes : la Plantanthere verdâtre (*Platanthera chlorantha*) et, sous le couvert des arbres, la magnifique Céphalanthère rouge (*Cephalanthera rubra*).



Platanthera chlorantha
Plantanthere verdâtre



Cephalanthera rubra
Céphalanthère rouge

Le Cytise des Alpes, espèce emblématique de l'adret de la Montagne de Lure

Un peu plus haut, en bord de route, nous apercevons à plusieurs reprises un arbuste magnifique, aux fleurs jaunes éclatantes, disposées en grappes pendantes, et nous nous arrêtons pour le photographier.

C'est le fameux Cytise des Alpes (*Laburnum alpinum*), qui trouve sur l'adret de la Montagne de Lure les conditions idéales pour son épanouissement.



Laburnum alpinum – Cytise des Alpes

On note au même endroit la présence du Sorbier des oiseleurs (*Sorbus aucuparia*), de l'Érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*) et du Genévrier commun (*Juniperus communis* subsp. *communis*).

Sur le talus, nous découvrons aussi, entre autres, le Lin cathartique (*Linum catharticum*), aux fleurs très petites, la Vesce des haies (*Vicia sepium*), l'Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*), l'Euphorbe petit-cyprès (*Euphorbia cyparissias*), le Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum*), la Gesse des prés (*Lathyrus pratensis*), la Laitue vivace (*Lactuca perennis*), la Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus*) ou encore le Silène d'Italie (*Silene italica*).



Linum catharticum
Lin cathartique

Arrêt à la station de Lure

Notre arrêt suivant intervient à la station de Lure, aujourd'hui fermée par manque d'enneigement. Elle était autrefois très prisée des amateurs de ski de la région marseillaise.

Il y subsiste aujourd'hui un restaurant et l'hiver on y pratique en famille la luge et le ski de fond.

Ici, nous sommes en présence de prairies d'altitude, qui s'étalent sur un vaste espace dégagé.



En bordure de parking, on remarque les grosses inflorescences du Chardon penché (*Carduus nutans*), l'Absinthe (*Artemisia absinthium*), la Linaire striée (*Linaria repens*), le Petit Népéta (*Nepeta nepetella* subsp. *nepetella*), la Renoncule crochue (*Ranunculus aduncus*), le Compagnon blanc (*Silene latifolia*), le Mélilot officinal (*Trigonella officinalis*, syn. *Melilotus officinalis*), le Grand Plantain (*Plantago major*), le Gaillard à feuilles d'asperge (*Galium corrudifolium*) et l'Ortie dioïque (*Urtica dioica*).

Carduus nutans
Chardon penché



Trigonella officinalis
Mélilot officinal

En s'avancant un peu dans la prairie, on peut observer deux espèces particulièrement intéressantes : le Lin d'Autriche (*Linum austriacum*) et l'Armérie faux buplèvre (*Armeria arenaria* subsp. *bupleuroides*), aux fleurs blanches ou rose clair, très abondante (voir la photo en haut de la page).

On note d'autres espèces plus discrètes et plus éparées : l'Argyrolobe de Zanon (*Argyrolobium zanonii*), le Calament acinos (*Clinopodium acinos*), le Gaillard croisettes (*Cruciata laevipes*), l'Ornithogale de Koch (*Ornithogalum kochii*), la Tunique prolifère (*Petrorhagia prolifera*), le Plantain moyen (*Plantago media*), ainsi que quelques plantes déjà vues auparavant (voir liste).

Quant au Genévrier nain (*Juniperus communis* subsp. *nana*), il forme de grandes taches vert foncé au milieu de la prairie.



Armeria arenaria subsp. *bupleuroides*
Armérie faux buplèvre



Linum austriacum
Lin d'Autriche

Station de la Vipère d'Orsini : pelouse rocailleuse et bosquets de sapins

Nous nous arrêtons ensuite à la station de la Vipère d'Orsini (*Vipera ursinii*). La Montagne de Lure abrite une des dernières populations françaises de ce petit reptile (moins de 50 cm) qui se nourrit presque exclusivement de criquets et de sauterelles. Elle est moins venimeuse que ses cousines. Des mesures de protection sont prises pour conserver son habitat ouvert.

Nous sommes ici sur des pelouses rocailleuses, avec des bosquets formés par d'assez grands Sapins blancs et Cèdres de l'Atlas ou des Genévriers. Les espèces en fleur sont très nombreuses. On en retrouve plusieurs déjà signalées aux arrêts précédents, on ne les citera donc pas (voir relevés).



Les pelouses caillouteuses, les bosquets de sapins et les touffes de genévriers.

On trouvera ci-dessous une petite galerie des espèces photographiées dans cette station.



Cephalanthera longifolia
Céphalanthère
à longues feuilles



Orchis purpurea
Orchis pourpre



Pedicularis gyroflexa
Pédiculaire arquée



Erysimum nevadense
subsp. *collisparsum*
Vélar provençal



Globularia cordifolia
Globulaire à feuilles en cœur



Antennaria dioica
Antennaire dioïque



Achillea odorata
Achillée odorante



Lathyrus pratensis
Gesse des prés



Linum suffruticosum subsp. *appressum*
Lin sous-arbrisseau



Arenaria grandiflora
Sabline à grandes fleurs



Cerastium arvense subsp. *suffruticosum*
Céraiste sous-ligneux



Thymus nervosus
Thym à nervures saillantes



Helianthemum italicum
Hélianthème d'Italie



Alchemilla glaucescens
Alchémille glauque



Veronica chamaedrys
Véronique petit chêne



Thalictrum minus
Petit Pigamon



On peut encore citer des espèces présentes mais non photographiées : l'Androsace de Vitaliano (*Androsace vitaliana*), le Chardon à tige nue (*Carduus defloratus* subsp. *defloratus*), la Laîche de Haller (*Carex halleriana*), le Liondent hispide (*Leontodon hispidus*), la Brunelle commune (*Prunella vulgaris*), le Petit Rhinanthus (*Rhinanthus minor*), le Framboisier (*Rubus idaeus*), l'Orpin blanc-jaunâtre (*Sedum ochroleucum*), le Trèfle des montagnes (*Trifolium montanum*) et le Genêt radié (*Genista radiata*) dont on reparlera plus loin.

Le pierrier au début de la crête

Lorsque nous arrivons à la crête, nous nous arrêtons tout de suite à la hauteur d'un pierrier.

En s'approchant, nous avons une vue panoramique sur la Vallée du Jabron en contrebas (côté nord).

Nous sommes en présence d'un éboulis mêlant des blocs de calcaire presque horizontaux et d'autres relativement fins, tous issus de la fracturation par le gel (gélifraction) des roches sommitales. Des espèces glaréicoles s'y sont installées et le colonisent « patiemment ».



Même si nous avons déjà cité certaines d'entre elles, il nous semble intéressant de les signaler. Ainsi on retrouve en abondance la Sabline à grandes fleurs et le Thym à nervures saillantes, mais aussi l'Hélianthème d'Italie, le Céraiste sous-ligneux, la Linaire striée, l'Anthyllis de Foronda, l'Anthyllis des montagnes, le Lotier corniculé, le Petit Pigamon, le Chardon à tige nue, ainsi que l'Absinthe, à la base du pierrier en bord de route, en compagnie du Chénopode Bon-Henri (*Blitum bonus-henricus*) et de l'Oseille à écussons (*Rumex scutatus*).

Quelques espèces nouvelles (pour la journée) sont présentes : la belle Campanule alpestre (*Campanula alpestris*), l'Alchémille à feuilles pliées (*Alchemilla alpigena*), la Biscutelle à tige courte (*Biscutella brevicaulis*), l'Épervière petite laitue (*Pilosella lactucella*), le Passerage à calice persistant (*Alyssum alyssoides*) et le Silène couché (*Silene vulgaris* subsp. *prostrata*). On remarque également les feuilles d'espèces qui ne sont pas encore en fleur : l'Adénostyle des Alpes (*Adenostyles alpina*), la Carline acaule (*Carlina acaulis* subsp. *caulescens*) et le fameux Panicaut épine-blanc (*Eryngium spinalba*), plante emblématique du Mont Ventoux et des Préalpes de Haute-Provence.



Arenaria grandiflora
Sabline à grandes feuilles



Thymus nervosus
Thym à nervures saillantes



Campanula alpestris
Campanule alpestre



Alchemilla alpigena
Alchémille à feuilles pliées



Blitum bonus-henricus
Chénopode Bon-Henri



Eryngium spinalba
Panicaut épine-blanc

De l'autre côté de la route, on remarque de nombreux plants du Trèfle des montagnes (*Trifolium montanum*), le Trèfle des prés (*Trifolium pratense* var. *pratense*), l'Avoine pubescente (*Avenula pubescens*) et la Véronique officinale (*Veronica officinalis*).



Avenula pubescens
Avoine pubescente



Trifolium montanum
Trèfle des montagnes



Veronica officinalis
Véronique officinale

Le sommet de Lure et son joyau : le Genêt radié

Un peu plus loin, nous nous garons au sommet de Lure, sur le parking permettant d'accéder à la table d'orientation. Vers l'est de celle-ci s'étend une lande à Genévrier nain (*Juniperus communis* subsp. *nana*) mais surtout à Genêt radié, ou à rameaux rayonnants, (*Genista radiata*), en pleine floraison.

C'est une espèce rare et strictement protégée, à l'aspect argenté et soyeux, endémique des Montagnes de Céuse et surtout de Lure, dont elle est le joyau !



Genista radiata – Genêt radié ou à rameaux rayonnants

En raison de la sécheresse et de son exposition maximale au soleil, cet espace est beaucoup moins fleuri que certaines années. La floraison a été plus précoce et très brève, beaucoup de plantes sont à l'état sec, notamment l'Orchis sureau (*Dactylorhiza sambucina*). On a pu néanmoins observer un buisson bizarrement isolé du Cytise à feuilles sessiles (*Cytisophyllum sessilifolium*), l'Orchis grenouille (*Coeloglossum viride*, syn. *Dactylorhiza viridis*), la Trinie glauque (*Trinia glauca*), la Fétuque cendrée (*Festuca cinerea*) au feuillage bleuâtre, quelques plants de la Gentiane jaune (*Gentiana lutea*), ainsi que certaines espèces déjà vues dans les pelouses rocailleuses, notamment l'Antennaire dioïque, le Céraiste sous-ligneux, le Lin sous-arbrisseau et la Pédiculaire arquée, très présents (voir relevé).



Cytisophyllum sessilifolium
Cytise à feuilles sessiles



Coeloglossum viride
Orchis grenouille



Festuca cinerea
Fétuque cendrée

La deuxième merveille de la Montagne de Lure : l'Ancolie de Bertoloni

Après avoir repris la route en direction du Pas de la Graille, nous nous sommes arrêtés dans un virage précédant une zone boisée. C'est là, sur les talus ensoleillés et ventés, que s'épanouit l'autre merveille de la Montagne de Lure : l'Ancolie de Bertoloni (*Aquilegia bertolonii*, syn. *Aquilegia reuteri*). Elle est assez proche de l'émblématique Ancolie des Alpes, mais ses éperons sont très courbés et elle ne fréquente pas les mêmes milieux.

La station est bien fournie cette année et les photographes ne savaient plus où donner de l'objectif !

Cette belle plante pousse en compagnie de la Raiponce orbiculaire (*Phyteuma orbiculare*), de l'Ornithogale de Koch (*Ornithogalum kochiana*), du Bouillon blanc (*Verbascum thapsus*) et d'autres espèces déjà citées : l'Argyrolobe de Zanon, la Globulaire à feuilles en cœur, l'Alchémille à feuilles pliées et l'Adénostyle des Alpes.

A proximité on trouve l'Érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*) et le Nerprun des Alpes (*Rhamnus alpina*).



Aquilegia bertolonii (syn. *Aquilegia reuteri*) – Ancolie de Bertoloni



Phyteuma orbiculare
Raiponce orbiculaire



Rhamnus alpina
Nerprun des Alpes




Globularia cordifolia
Globulaire à feuilles en cœur

Le Pas de la Graille : passage de l'adret à l'ubac

Notre prospection suivante s'est déroulée au Pas de la Graille. C'est l'endroit où l'on passe de l'adret à l'ubac. Un petit parking dans le virage permet de s'arrêter et de pouvoir herboriser des deux côtés de la route. Il est bordé d'un talus de rochers sur lequel poussent quelques plantes et au bas duquel une petite friche s'est installée.

On y observe encore quelques espèces héliophiles comme le peu fréquent Cerfeuil lustré (*Anthriscus nitida*), l'Épervière à feuilles de statice (*Tolpis staticifolia*), la Valériane des montagnes (*Valeriana montana*), le Gaillet mollugine (*Galium mollugo* subsp. *mollugo*), le Petit Calament (*Clinopodium nepeta* subsp. *nepeta*), l'Hélianthème nummulaire (*Helianthemum nummularium* subsp. *nummularium*), ainsi que des Poacées : le Fromental élevé (*Arrhenatherum elatius*), le Brome dressé (*Bromopsis erecta*) et le Brome stérile (*Anisantha sterilis*).



Anthriscus nitida
Cerfeuil lustré



Tolpis staticifolia
Épervière à feuilles de statice

On retrouve des espèces déjà citées comme l'Absinthe, le Chardon à tige nue, l'Épervière leiopogon, le Nerprun des Alpes, l'Armérie faux buplèvre, le Vêlar provençal, le Gaillet à feuilles d'asperge, le Calament acinos, le Lotier corniculé, le Céraiste sous-ligneux, l'Alchémille à feuilles pliées, le Framboisier ou l'Alisier blanc.

Sur les rochers, en dehors du Thym à nervures saillantes, présent sur toute la crête, on remarque de nombreux plants de la Saxifrage sillonnée (*Saxifraga exarata* subsp. *exarata*), trois sortes d'Orpins (*Sedum album*, *Sedum acre* et *Sedum ochroleucum*) et une petite fougère, le Cystoptéris fragile (*Cystopteris fragilis*).

Sur le sentier en prolongement du virage, on trouve une petite station de la Spirée filipendule (*Filipendula vulgaris*).



Carduus defloratus
Chardon à tige nue



Hieracium leiopogon
Épervière leiopogon



Valeriana montana
Valériane des montagnes



Cystopteris fragilis
Cystoptéris fragile



Saxifraga exarata subsp. *exarata*
Saxifrage sillonnée




Filipendula vulgaris
Spirée filipendule



Sedum acre
Orpin âcre

Mais c'est surtout le début de la descente, sur le bas du talus, à l'ombre, qui se révèle très intéressant.

C'est la flore d'ubac, avec ses grandes plantes aux belles fleurs, formant comme une petite mégaphorbiaie.



Herborisation à l'ubac.

On y trouve pêle-mêle la Valériane des montagnes (*Valeriana montana*), abondante, l'Aconit tue-loup (*Aconitum lycoctonum*), la Renoncule à feuilles de platane (*Ranunculus platanifolius*), le Séneçon de Fuchs (*Senecio ovatus* subsp. *alpestris*), le Chérophylle doré (*Chaerophyllum aureum*), le Camérisier des Alpes (*Lonicera alpigena*), le Rosier des Alpes (*Rosa pendulina*), la Luzule couleur de neige (*Luzula nivea*), la Renoncule crochue (*Ranunculus aduncus*) et le Silène dioïque (*Silene dioica*).



Ranunculus platanifolius
Renoncule à feuilles de platane



Silene dioica
Silène dioïque, Compagnon rouge



Lonicera alpigena
Camérisier des Alpes



Ranunculus aduncus
Renoncule crochue



Rosa pendulina
Rosier des Alpes

On peut également observer l'Ancolie commune (*Aquilegia vulgaris*), qui possède des fleurs bleu foncé plus nombreuses et plus petites que l'Ancolie de Bertoloni, et dont les étamines dépassent le tube de la corolle.

Des espèces de moindre taille viennent compléter ce bel ensemble : la délicate Saxifrage à feuilles en coin (*Saxifraga cuneifolia*), l'Aspérule odorante (*Galium odoratum*), le Géranium herbe à robert (*Geranium robertianum*), aux feuilles exceptionnellement très découpées, et la Fraise des bois (*Fragaria vesca*).



Aquilegia vulgaris
Ancolie commune



Galium odoratum
Aspérule odorante



Geranium robertianum
Géranium herbe à robert



Saxifraga cuneifolia
Saxifrage à feuilles en coin



Fragaria vesca
Fraise des bois

D'autres ne sont pas encore en fleur comme l'Épilobe à feuilles étroites (*Epilobium angustifolium*), la Prénanthe pourpre (*Prenanthes purpurea*), l'Adénostyle des Alpes et l'Absinthe, déjà cités. L'Érable sycomore et le Cytise des Alpes sont aussi présents.

Dernier arrêt à l'ubac, au bas de la descente, en lisière de forêt

Nous avons décidé de faire toute la descente sur l'ubac et nous nous sommes arrêtés une dernière fois tout en bas, après les longs virages, pour une dernière exploration en lisière de forêt. Malgré la sécheresse, ce milieu est toujours à l'ombre et conserve donc une humidité résiduelle minimale. Les plantes sont hautes et bien vertes.



Deux aspects de la végétation de l'ubac avec la Gentiane jaune (à g.) et la Vesce à feuilles étroites (à dr.).

On découvre ainsi quelques espèces intéressantes supplémentaires : la Barbe de bouc (*Aruncus dioicus*), le Gaillet aristé (*Galium aristatum*), la Digitale jaune (*Digitalis lutea*), la Gentiane jaune (*Gentiana lutea*), la Coronille bigarrée (*Coronilla varia*), la Céphalanthère de Damas (*Cephalanthera damasonium*), l'Orchis moustique (*Gymnadenia conopsea*), la Campanule à feuilles de pêcher (*Campanula persicifolia*), la Raiponce en épi (*Phyteuma spicatum*), la Tanaisie en corymbe (*Tanacetum corymbosum*), la Laïche glauque (*Carex flacca*), la Viorne lantane (*Viburnum lantana*), le Laser de France (*Laserpitium gallicum*), le Laser à larges feuilles (*Laserpitium latifolium*), le Polygale commun (*Polygala vulgaris*), l'Anthyllis vulnéraire (*Anthyllis vulneraria* subsp. *polyphylla*) et la Vesce à feuilles étroites (*Vicia tenuifolia*).



Aruncus dioicus
Barbe de bouc



Gentiana lutea
Gentiane jaune





Galium aristatum
Gaillet aristé



Luzula nivea
Luzule couleur de neige



Vicia tenuifolia
Vesce à feuilles étroites



Carex flacca
Laîche glauque



Gymnadenia conopsea
Orchis moustique, Orchis moucheron



Coronilla varia
Coronille bigarrée



On retrouve aussi l'Ancolie commune, la Gesse des prés, le Lotier corniculé, la Luzule couleur de neige, la Raiponce orbiculaire et la Vesce des haies, tous déjà vus dans des stations précédentes.

Pour les arbres, on remarque l'Érable champêtre (*Acer campestre*) et l'Érable à feuilles d'obier (*Acer opalus*).

Au total, ce sont 183 espèces qui ont été observées durant cette magnifique journée sur la Montagne de Lure. On peut consulter les relevés complets par stations, par ordre alphabétique et par familles sur notre site internet (documents séparés).

Les insectes du jour



Arima marginata
Arime marginée



Trichius gallicus
Trichie de France



Dryope flaveola
Dryomyze jaunâtre



Parnassius apollo - Apollon



Vanessa cardui
Belle-Dame



Melitaea diamina
Mélitée noirâtre



Pieris brassicae
Piéride du chou



Zygaena loti
Zygène du lotier



Zygaena transalpina
Zygène transalpine

Texte, photos de fleurs et d'insectes : Jean-Claude MÉRIC
Photos de paysages et d'insectes : Martine AÏTELLI